

## **PORTARIA IBAMA Nº 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO 1989**

(Já retificada pela Portaria IBAMA nº 221/90)

Dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735,

de 22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de fevereiro de 1989,

**RESOLVE:**

Art. 1º . Como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

### **1.0 - MAMMALIA**

#### **1.1 - PRIMATES**

- \* *Alouatta belzebul belzebul* (Linnaeus, 1766). Família CEBIDAE. Nome popular: guariba.
- \* *Alouatta fusca* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barbado, guariba.
- \* *Ateles belzebuth* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.
- \* *Ateles paniscus* (Linnaeus, 1758). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.
- \* *Brachyteles arachnoides* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: muriqui, monocarvoeiro.
- \* *Cacajao calvus* (I. Geoffroy, 1847). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari.
- \* *Cacajao melanocephalus* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari-preto.
- \* *Callicebus personatus* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: guigó, sauá.
- \* *Callimico goeldii* (Thomas, 1904). Família CALLIMICONIDAE. Nome popular: calimico.
- \* *Callithrix argentata leucippe* (Thomas, 1922). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
- \* *Callithrix aurita* (Humboldt, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-de-serra-escuro.
- \* *Callithrix flaviceps* (Thomas, 1903). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-da-serra.
- \* *Callithrix humeralifer* (E. Geoffroy, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
- \* *Cebus apella xanthosternos* (Wied, 1820). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-pregodopeito-amarelo.
- \* *Chiropotes albinasus* (I. Geoffroy & Daville, 1848). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu-de-narizbranco.
- \* *Chiropotes satanas utahicki* (HersHKovitz, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
- \* *Chiropotes satanas satanas* (Hoffmannesegg, 1807). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
- \* *Lagothrix lagotricha* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barrigudo.
- \* *Leontopithecus chrysomelas* (Kubl, 1620). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-decara-dourada.
- \* *Leontopithecus chrysopygus* (MyCan, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-preto.
- \* *Leontopithecus rosalia* (Linnaeus, 1766). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-dourado, sagui-piranga.
- \* *Pithecia albicans* (Gray, 1860). Família CEBIDAE. Nome popular: parauacú-branco.
- \* *Saguinus bicolor* (Spix, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: soim-de-coleira.
- \* *Saguinus imperator* (Goeldi, 1907). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-bigodeiro.
- \* *Saimiri vanzolinii* (Ayres, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: mico-de-cheiro.

#### **1.2 - CARNIVORA**

- \* *Atelicyon microtis* (Sclater, 1883). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-de-orelhacurta.
- \* *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815). Família CANIDAE. Nome popular: lobo-guará, lobo-vermelho.
- \* *Felis colocolo* (Molina, 1810). Família FELIDAE. Nome popular: gato-palheiro.
- \* *Felis concolor* (Linnaeus, 1771). Família FELIDAE. Nome popular: sussuarana, onça-parda.
- \* *Felis geoffroyi* (d'Orbigny & Gervais, 1844). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato.
- \* *Felis pardalis* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: jaguatirica.
- \* *Felis tigrina* (Schreber, 1775). Família FELIDAE. Nome popular: gato-domato.
- \* *Felis wiedii* (Schinz, 1921). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato, maracajá.
- \* *Grammogale africana* (Demarest, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: doninhaamazônica.
- \* *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: lontra.\* *Panthera onça* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: onça-pintada, pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu.
- \* *Pteronura brasiliensis* (Gmelin, 1788). Família MUSTELIDAE. Nome popular: ariranha.
- \* *Speothos venaticus* (Lund, 1842). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-vinagre.

### 1. 3 - XENARTHRA

- \* *Bradypus torquatus* (Desmarest, 1816). Família BRADYPODIDAE. Nome popular: preguiça-decoleira.
- \* *Mymercophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758). Família MYMERCOPHAGIDAE. Nome popular: tamanduá-bandeira.
- \* *Priodontes maximus* (Kerr, 1792). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-canastra, tatuçu.
- \* *Tolypeutes tricinctus* (Linnaeus, 1758). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-bola, tatuapara.

### 1. 4 - SIRENIA

- \* *Trichechus inunguis* (Natterer, 1883). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, guarabá.
- \* *Trichechus manatus* (Linnaeus, 1758). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, peixeboi-marinho, manati.

### 1. 5 - CEATACEA

- \* *Eubalena australis* (Desmoulins, 1822). Família BALAENIDAE. Nome popular: baleia-franca, baleiafranca-austral.
- \* *Megaptera novaeangliae* (Borowaki, 1781). Família BALAENOPTERIDAE. Nome popular: jubarte.
- \* *Potonporia blainvillei* (Gervais & d'Orbigny, 1844). Família PONTOPORIDAE. Nome popular: toninho, boto-cachimbo.

### 1. 6 - RODENTIA

- \* *Abrawayaomys ruschii* (Cunha & Cruz, 1979). Família CRICETIDAE.
- \* *Chaetomys subspinosus* (Olfers, 1818). Família ERETHIZONTIDAE. Nome popular: ouriço-preto.
- \* *Juscelinomys candango* (Moojen, 1965). Família CRICETIDAE.
- \* *Kunsia tomentosus* (Lichtenstein, 1830). Família CRICETIDAE.
- \* *Phanomys ferrugineus* (Thomas, 1894). Família CRICETIDAE. Nome popular: rato-do-mato-ferrugíneo.
- \* *Rhagomys rufescens* (Thomas, 1886). Família CRICETIDAE. Nome popular: rato-do-mato-laranja.

### 1. 7. ARTIODACTYLA

- \* *Blastocerus dichotomus* (Illiger, 1815). Família CERVIDAE. Nome popular: cervo-do-pantanal.
- \* *Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780). Família CERVIDAE. Nome popular: caribau.
- \* *Ozotoceros bezoarticus* (Linnaeus, 1758). Família CERVIDAE. Nome popular: veado-campeiro.

## 2. 0 - AVES

### 2. 1 - TINAMIFORMES

- \* *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). Família TINAMIDAE. Nome popular: jão-do-sul, zabelê, juó.
- \* *Nothura minor* (Spix, 1825). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-mineira, codornaburaqueira, buraqueira.
- \* *Taoniscus nanus* (Tomminck, 1815). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-buraqueira, perdigão, inhambú-carapé.
- \* *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). Família TINAMIDAE. Nome popular: macuco, macuca.

### 2. 2 - CICONIIFORMES

- \* *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758). Família THRESKIORNITHIDAE. Nome popular: guará.
- \* *Tigrisoma fasciatum fasciatum* (Such, 1825). Família ARDEIDAE. Nome popular: socó-boi.

### 2.3 - PHOENICOPTERIFORMES

- \* *Phoenicopterus ruber* (Linnaeus, 1758). Família PHOENICOPTERIDAE. Nome popular: ganso-donorte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

### 2. 4 - ANSERIFORMES

- \* *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817). Família ANATIDAE. Nome popular: mergulhão, patão, patomergulhão.

### 2. 5 - FALCONIFORMES

- \* *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: tauató-pintado, gavião-pombo-grande.
- \* *Falco deiroleucus* (Temminck, 1825). Família FALCONIDAE. Nome popular: falcão-de-peitovermelho.\* *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-real, gavião-depenacho, uiraçu-verdadeiro, cutucurim, harpia.
- \* *Harpaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: águia-cinzenta.
- \* *Leucopternis lacemulata* (Temminck, 1827). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.
- \* *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.
- \* *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-depenacho, uiraçu-falso.
- \* *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-preto, apacamim, gavião-pato.

### 2. 6 - GALLIFORMES

- \* *Crax blumerbachii* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-do-sudeste.
- \* *Crax fasciolata pinima* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: Mutum-depenacho, mutum-pinima.
- \* *Mitu mitu mitu* (Linnaeus, 1766). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-cavalo, mutum-êtê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.
- \* *Penelope jacucaca* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacucaca.
- \* *Penelope obscura bronzina* (Hellmayr, 1914). Família CRACIDAE. Nome popular: jacoguossu, jacuaçu.

\* *Penelope ochrogaster* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: jacu-de-barrigacastanha.

\* *Pepile jacutinga* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacutinga.

## 2. 7 - CHARADRIIFORMES

\* *Numenius borealis* (Forator, 1772). Família SCOLOPACIDAE. Nome popular: maçarico-esquimó.

## 2. 8 - COLUMBIFORMES

\* *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Família COLUMBIDAE. Nome popular: pararu, pomba-deespelho.

\* *Columbina cyanopis* (Pelzeln, 1870). Família COLUMBIDAE. Nome popular: rolinha-de-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

## 2. 9 - PSITTACIFORMES

\* *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-cararoxa, chaurá.

\* *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.

\* *Amazona rhodocorytha* (Salvatori, 1890). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chaurá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.

\* *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-peitoroxo, papagaio-caboclo, papagaio-curraleiro, jurueba.

\* *Anodorhynchus glaucus*(\*) (Vieillot, 1816). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azulpequena.

\* *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1720). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-delear-grande, araraúna.

\* *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1857). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-delear.

\* *Aratinga guarouba* (Gmelin, 1877). Família PSITTACIDAE. Nome popular: guaruba, ararajuba.

\* *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832). Família PSITTACIDAE. Nome popular: ararinha-azul.

\* *Pyrihura cruentala* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: tiriba, fura-mato, cara-suja.

\* *Pyrihura leucotis* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: fura-pato, tiriba-de-orelhabranca.

\* *Touit melanonota* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-vermelha.

\* *Touit surda* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-amarela.

\* *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). Família PSITTACIDAE. Nome popular: sabiá-cica, araquaiáva.

## 2. 10. CUCULIFORMES

\* *Neomorphus geoffroyi dulcis* (Sneath, 1927). Família CUCULIDAE. Nome popular: aracuão, jacu-molambo, jucu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.

\* *Neomorphus geoffroyi geoffroyi* (Temminck, 1820). Família CUCULIDAE. Nome popular: jacuestalo.

2. 11 - CAPRIMULGIFORMES\* *Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, ratobranco.

\* *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: curiangu-dobanhado.

\* *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, tesoura-gigante.

\* *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821). Família NYCTIBIIDAE. Nome popular: mãe-da-lua.

## 2. 12 - APODIFORMES

\* *Phaethomis superciliosus margaretae* (Ruschi, 1972). Família TROCHILIDAE. Nome popular: besourão-de-rabo-branco.

\* *Ranphodon dohrnii* (Boucier & Mulsant, 1852). Família TROCHILIDAE. Nome popular: balançarabo-canela, beila-flor-de-Dohm, besourão.

## 2. 13 - PICIFORMES

\* *Campephylus robustus* (Lichtenstein, 1819). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-rei.

\* *Celeus torquatus tinnunculus* (Wagler, 1829). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-coleira.

\* *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-cara-amarela.

\* *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). Família GALBULIDAE. Nome popular: cuitelão, bicudo, violeiro.

## 2. 14 - PASSERIFORMES

\* *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: negrinho-do-mato.

\* *Alecrituros risoria* (Vieillot, 1824). Família TYRANNIDAE. Nome popular: galito, tesoura-de-campo, bandeira-do-campo.

\* *Anthus nattereri* (Sclater, 1878). Família MOTTACILLIDAE. Nome popular: caminheiro-grande.

\* *Calyptura cristata*(\*) (Vieillot, 1818). Família CONTINGIDAE. Nome popular: tietê-de-coroa.

\* *Carduelis yarrellii* (Audubon, 1839). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: coroinha, pintassilgodo-nordeste.

\* *Carpornis melanocephalus* (Wied, 1820). Família CONTINGIDAE. Nome popular: sabiá-pimenta.

\* *Cercomacra carbonaria* (Sclater & Salvin, 1873). Família FORMICARLIDAE.

\* *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859). Família FURNARIIDAE.

\* *Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939). Família ENERIZIDAE.

\* *Cotinga maculata* (Müller, 1776). Família COTINGIDAE. Nome popular: crejoá, quiruá, catingá.

\* *Culioivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscas-docampo.

\* *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). Família ICTERIDAE. Nome popular: anumará.

\* *Daonis nigripes* (Pelzeln, 1856). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saí-de-pernas-pretas.

\* *Formicivora erythronotos* (Hartlaub, 1852). Família FORMICARIIDAE.

\* *Formicivora iheringi* (Hellmayr, 1909). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formiga.

\* *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: cardeal-amarelo.

\* *Hemitriccus aenigma* (Zimmer, 1940). Família TYRANNIDAE.

\* *Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscasestrela.

\* *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Família TYRANNIDAE.

\* *Herpsilochmus pectoralis* (Sclater, 1857). Família FORMICARIIDAE.

\* *Lodopleuta pipra* (Lesson, 1831). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambezinho.

- \* *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). Família COTINGIDAE. Nome popular: sabiá-da-mata-virgem,  
sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.
- \* *Megaxenops parnaguae* (Reiser, 1905). Família FURNARIIDAE. Nome popular: bico-virão-decatinga.
- \* *Merulaxis stresemanni* (Sick, 1960). Família RHINOCHYPTIDAE.
- \* *Myadestes leucogenys* (Cabanis, 1851). Família TURDIDAE. Nome popular: sabiá-castanho.
- \* *Mirmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.
- \* *Mirmeciza stictothorax* (Todd, 1927). Família FORMICARIIDAE.
- \* *Mymortherula minor* (Salvatoti, 1867). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: choquinha.
- \* *Neimosia rourei* (Cabanis, 1870). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saira-apunhalada.
- \* *Oryzorobus maximiliani* (Cabanis, 1851). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: bicudo,  
bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.
- \* *Phibaiura fiavirostris* (Vieillot, 1816). Família COTINGIDAE. Nome popular: tesourinha.\*
- Phylloscartes ceciliae* (Teixeira, 1987). Família TYRANNIDAE.
- \* *Phylloscartes roquettei* (Shethiage, 1928). Família TYRANNIDAE.
- \* *Philydor novaesi* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FURNARIIDAE.
- \* *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). Família COTINGIDAE. Nome popular: cameleirinho-de-chapéupreto.
- \* *Platyrinchus leucoryphus* (Wied, 1831). Família TYRANNIDAE. Nome popular: patinho-gigante.
- \* *Poecilurus Kollari* (Pelzein, 1856). Família FURNARIIDAE.
- \* *Pospiza cinerea* (Bonaparte, 1850). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: andorinha-do-oco-dopau, capacetinho-do-oco-do-pau.
- \* *Procnias averano averano* (Illermann, 1783). Família COTINGIDAE. Nome popular: araponga-donordeste, guiraponga.
- \* *Pyriglena atra* (Swainson, 1625). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas.
- \* *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw, 1792). Família COTINGIDAE. Nome popular: pavao,  
pavão,  
pavó, pavão-do-mato.
- \* *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas-degravatá.
- \* *Scytalopus novacapitalis* (Sick, 1958). Família RHINOCRYPTIDAE.
- \* *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: papa-capim,  
cigarra-verdadeira.
- \* *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pichochó,  
papa-arroz.
- \* *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: caboclinho-de-papobranco.
- \* *Sturnella defilipii* (Bonaparte, 1851). Família ICTERIDAE. Nome popular: peito-vermelho-grande.
- \* *Synallaxis infuscata* (Pinto, 1950). Família FURNARIIDAE.
- \* *Tangara fastuosa* (Lesson 1831). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pintor-verdadeiro.
- \* *Terenura sicki* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FORMICARIIDAE.
- \* *Thamnomanes lumbeus* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.
- \* *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). Família FURNARIIDAE. Nome popular: rabo-amarelo.
- \* *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788). Família ICTERIDAE. Nome popular: pássaro-preto-de-hasteamarela.

\* *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu-donordeste.

\* *Xiphocolaptes franciscanus* (Sneethlage, 1927). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu.

\* *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambé-de-asabranca, cotinga, ferrugem.

### 3. 0 - REPTILIA

#### 3. 1 - CHELONIA

\* *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: cabeçuda, tartaruga-meiopele.

\* *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-verde.

\* *Dermochelys coriacea* (Linnaeus, 1758). Família DERMOCHELYDAE. Nome popular: tartaruga-decouro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.

\* *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-depente.

\* *Lepidochelys olivacea* (Enscholtz, 1829). Família CHELONIDAE.

\* *Phrynops hoguei* (Mertens, 1957). Família CHELONIDAE.

#### 3. 2 - SQUAMATA

\* *Lachesis muta rhombeata* (Wied, 1825). Família VIPERIDAE. Nome popular: surucu-pico-do-jaca, surucucu. (((verificar nome correto)))

#### 3. 3 - CROCODILIA

\* *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaré-de-papoamarelo.

\* *Melanosuchus niger* (Spix, 1825). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaréaçu.

### 4. 0 - AMPHIBIA

\* *Paratelmatobius gaiageae* (Cochran, 1938). Família LEPTODACTYLIDAE.

### 5. 0 - INSECTA

#### 5. 1 - LEPIDOPTERA - Borboleta

\* *Dasyophthalma vertebralis*(\*) (Butler, 1969). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eresia orysice*(\*) (Geyer, 1832). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eurytides iphitas*(\*) (Hubner, 1821). Família PAPILIONIDAE.

\* *Eurytides lysithous harrisianus* (Swainson,1822). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eutresis hypereia imeriensis* (Brown, 1977). Família NYMPHALIDAE.

\* *Heliconius nattereei* (Felder&Felder,1865). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hyaliris fiammctta*(\*) (Hewitson, 1852). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hyaliris leptalina leptalina*(\*) (Felder & Felder, 1865). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hypoleria fallens* (Haensch, 1905). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hypoleria mulviana* (D'Almeida, 1958). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hypothesis mayl* (D'Almeida, 1945). Família NYMPHALIDAE.

\* *Joiceya praeclara* (Talbot, 1928). Família LICAENIDAE.

\* *Mechanitis bipuncta* (Forbes, 1948). Família NYMPHALIDAE.

\* *Melinaea mnasias* (Hewitson, 1855). Família NYMPHALIDAE.

\* *Huschoneura methymna* (Godart, 1819). Família PIERIDAE.

\* *Napeogenes cyrianassa xanthone* (Bates,1862). Família NYMPHALIDAE.

\* *Orobassolis orhamentalis* (Stichel, 1906). Família NYMPHALIDAE.

\* *Papilio himeros himeros* (Hopffer, 1866). Família PAPILIONIDAE.

\* *Papilio himeros baia* (Rothschild & Jordan, 1906). Família PAPILIONIDAE.

\* *Papilio zagreus zagreus* (Doubleday, 1847). Família PAPILIONIDAE.

\* *Papilio zagreus neyi* (Niepelt, 1909). Família PAPILIONIDAE.

- \* *Papilio zagreus bedoci* (LeCerf, 1925). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Parides asceanius* (Cramer, 1775). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Parides lysander mattogrossensis* (Talbot, 1928). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Perrhybris flava* (Oberthur, 1895). Família PIERIDAE.
- \* *Scada Karschina delicata* (Talbot, 1932). Família NYMPHALIDAE.

#### 5. 2 - ODONATA - Libélula

- \* *Leptagrion dardanoi* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.
- \* *Leptagrion siqueirai* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.
- \* *Mecistogaster asticta* (Selys, 1860). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.
- \* *Mecistogaster pronoti*(\*) (Sjoestedl, 1918). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.

#### 6. 0 - ONYCHOPHORA

- \* *Peripatus acacioi* (Marcus & Marcus, 1955). Família PERIPATIDAE.

#### 7. 0 - CNIDARIA

- \* *Millepora nitidae* (Verreill, 1868). Família MILLEPORIDAE. Nome popular: coral-de-fogo.

(\*) Espécies provavelmente extintas.

Art. 2º . Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967.

Art. 3º . A não observância da presente portaria constitui infração sujeitas as penalidades previstas na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e na Lei nº 7.653 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo

dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria IBDF nº 3.481, de 31 de maio de 1973, e todas as disposições em contrário.